

Copie anonyme - n°anonymat : 467717

D9-00088
467717
Mat Appro



Code épreuve : 297

Nombre de pages : 27

Session : 2026

Épreuve de : Mathématiques approfondies.

Consignes

- Remplir soigneusement l'en-tête de chaque feuille avant de commencer à composer
- Rédiger avec un stylo non effaçable bleu ou noir
- Ne rien écrire dans les marges (gauche et droite)
- Numéroté chaque page (cadre en bas à droite)
- Placer les feuilles A3 ouvertes, dans le même sens et dans l'ordre

Exercice 1.

1) def simul Z() :

X = rd.random()

Y = rd.random()

return (X*Y)

2) X_1 et X_2 sont deux variables qui admettent une espérance.

De plus,

$|Z| \leq 1$ car $Z = X_1 X_2$ et $X_1(\Omega) = X_2(\Omega) =]0;1[$.

Donc, par domination, Z admet une espérance et un moment d'ordre 2.

De plus, comme X_1 et X_2 sont indépendantes, on a :

$$\mathbb{E}(Z) = \mathbb{E}(X_1)\mathbb{E}(X_2) = \frac{1}{4} \text{ et } \mathbb{E}(Z^2) = \mathbb{E}(X_1^2)\mathbb{E}(X_2^2) = \frac{1}{9}$$

Donc

Z admet une espérance par domination et
 $\mathbb{E}(Z) = \frac{1}{4}$ et $\mathbb{V}(Z) = \frac{7}{144}$ par König-Huygens.

par le lemme
des carrés

3) a) $X_1(\Omega) =]0;1[$.

Donc $(\ln(X_1))(\Omega) = \mathbb{R}_-$. Don $Y_1(\Omega) = \mathbb{R}_-$

Donc : $\forall x > 0, F(x) = 1$

$\forall x \leq 0, F(x) = P(Y_1 \leq x)$

$$\begin{aligned} &= P(\ln(X_1) \leq x) \quad \downarrow \text{ par croissance} \\ &= P(X_1 \leq e^x) \quad \text{de } x \text{ vers } e^x \text{ sur } \mathbb{R}_- \\ &= e^x. \end{aligned}$$

Donc :

$$f: x \mapsto \begin{cases} e^x & \text{si } x \leq 0 \\ 1 & \text{sinon.} \end{cases}$$

est la fonction de répartition de Y_1 et de Y_2 .

3) b) Une densité de Y_1 et Y_2 est

$$f: x \mapsto \begin{cases} e^x & \text{si } x \leq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

4) a) Y_1 et Y_2 sont deux variables indépendantes par le lemme des coalitions.

Alors, on note h une densité de $Y_1 + Y_2$.

$$(Y_1 + Y_2)(\Omega) = \mathbb{R}_-.$$

Alors, on peut poser que $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $h(x) = 0$

sinon, $\forall x \in \mathbb{R}_-$,

$$h(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x-t)f(t)dt$$

$$= \int_{-\infty}^0 f(x-t)e^t dt$$

$$= \int_x^0 e^{x-t}e^t dt$$

$$= \int_x^0 e^x dt$$

$$= e^x(-x)$$

$$= -xe^x.$$

$$\text{Donc finalement } h: x \mapsto \begin{cases} -xe^x & \text{si } x \leq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \text{ est bien une densité de } Y_1 + Y_2.$$

4) b) on sait que $(\gamma_1 + \gamma_2)(\cdot) = \mathbb{R}_-$.

Donc:

$$\forall x \in \mathbb{R}_-, H(x) = \int_{-\infty}^x h(t) dt \\ = \int_{-\infty}^x -te^t dt$$

Alors, on pose $A > 0$. On pose u et v les fonctions $\mathcal{C}^1$ sur $[-A; x]$ définies telles que
 $\forall t \in [-A; x], u(t) = e^t$ et $v(t) = -t$
et $\forall t \in [-A; x], u'(t) = e^t$ et $v'(t) = -1$.

Ainsi, par intégration par parties sur un fermé,

$$\int_{-A}^x u'(t)v(t) dt = \left[-te^t \right]_{-A}^x + \int_{-A}^x e^t dt \\ = -xe^x + Ae^{-A} + \left[e^t \right]_{-A}^x \\ = -xe^x + Ae^{-A} + e^x - e^{-A} \\ = (1-x)e^x + e^{-A}(A-1)$$

or: par croissances comparées, $\lim_{A \rightarrow +\infty} e^{-A}(A-1) = 0$.

Donc: $\forall x \in \mathbb{R}_-, H(x) = (1-x)e^x$

et $\forall x \in \mathbb{R}_+, H(x) = 1$.

Donc $H: x \mapsto \begin{cases} (1-x)e^x & \text{si } x \leq 0 \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$ est la fonction de répartition de $\gamma_1 + \gamma_2$.

4) c) $Z(\cdot) =]0; 1[$ car $z = x_1 x_2$.

or, on remarque que $\gamma_1 + \gamma_2 = \ln(x_1) + \ln(x_2) = \ln(x_1 x_2)$.

Donc $z = e^{\gamma_1 + \gamma_2}$.

Enfin, $\forall u \in]0;1[$,

$$f_Z(u) = P(Z \leq u)$$

$$= P(X_1 X_2 \leq u)$$

} car $\ln$ est croissante

$$= P(\ln(X_1 X_2) \leq \ln(u))$$

$$= H(\ln(u))$$

$$= (1 - \ln(u))u$$

$$\forall u \in]-\infty;0], f_Z(u) = 0$$

$$\forall u > 1, f_Z(u) = 1.$$

Donc:

$$f_Z: u \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } u \leq 0 \\ (1 - \ln(u))u & \text{si } u \in]0;1[\\ 1 & \text{si } u \geq 1 \end{cases}$$

Donc une densité de Z est bien

$$f_Z: u \mapsto \begin{cases} f'_Z(u) & \text{si } u \in]0;1[\\ 0 & \text{si } u \leq 0 \text{ ou } u \geq 1 \end{cases}$$

Donc:

$$f_Z: u \mapsto \begin{cases} -\ln(u) & \text{si } u \in]0;1[\\ 0 & \text{si } u \leq 0 \text{ ou } u \geq 1 \end{cases}$$

5) a) Soit $n \in \mathbb{N}$.

La fonction $u \mapsto u^n \ln(u)$ est continue sur $]0;1[$. L'intégrale est donc impropre en 0.

On: si on prend $1 > A > 0$. On pose u et v deux fonctions $\mathcal{C}^1$ telles que

$$\forall t \in [A;1], u(t) = \ln(t) \text{ et } v(t) = \frac{t^{n+1}}{n+1}$$

et

$$\forall t \in [A;1] u'(t) = \frac{1}{t} \text{ et } v'(t) = t^n$$

Alors, par intégration par parties sur un segment,

Copie anonyme - n°anonymat : 467717

Emplacement QR Code	Code épreuve : 297	Nombre de pages : 27	Session : 2026
	Épreuve de : Mathématiques approfondies		
Consignes <ul style="list-style-type: none"> • Remplir soigneusement l'en-tête de chaque feuille avant de commencer à composer • Rédiger avec un stylo non effaçable bleu ou noir • Ne rien écrire dans les marges (gauche et droite) • Numéroté chaque page (cadre en bas à droite) • Placer les feuilles A3 ouvertes, dans le même sens et dans l'ordre 			

$$\begin{aligned}
 \int_A^1 x^n \ln(x) dx &= \left[\ln(x) \frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_A^1 - \int_A^1 \frac{x^{n+1}}{n+1} \times \frac{1}{x} dx \\
 &= -\ln(A) \frac{A^{n+1}}{n+1} - \frac{1}{n+1} \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_A^1 \\
 &= -\frac{\ln(A) A^{n+1}}{n+1} - \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{A^{n+1}}{(n+1)^2}
 \end{aligned}$$

on: $\lim_{\substack{A \rightarrow 0 \\ A > 0}} -\frac{\ln(A) A^{n+1}}{n+1} = 0$ par croissances comparées

et $\lim_{\substack{A \rightarrow 0 \\ A > 0}} \frac{A^{n+1}}{(n+1)^2} = 0$.

Pour: $\forall n \in \mathbb{N}$, l'intégrale converge et $\int_0^1 x^n \ln(x) dx = -\frac{1}{(n+1)^2}$

5) b) Par définition avec la dérivée, avec $n=1$

$$E(z) = - \int_0^1 t \ln(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} t f_z(t) dt$$

D'après le question précédente, on a donc que avec $n=1$,

$$E(z) = \frac{1}{4}$$

De plus, par théorème de transfert,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(Z^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} t^2 f_Z(t) dt \\ &= - \int_0^1 t^2 \ln(t) dt \quad \text{d'après 9.5.a) avec } n=2 \\ &= \frac{1}{9} \end{aligned}$$

Donc:
$$\mathbb{V}(Z) = \mathbb{E}(Z^2) - \mathbb{E}(Z)^2 = \frac{1}{9} - \frac{1}{16} = \frac{7}{144}$$

Exercice 2.

1) On pose $\forall n \geq 2$, P_n : u_n et v_n sont bien définies et $u_n > 0$ par principe de récurrence

Initialisation: $n=2$.

u_2 et v_2 sont bien définies avec $u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} > 0$ et $v_2 = \frac{2}{1/\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$.

Donc P_2 est bien vérifiée

Hérédité: on pose $n \in \mathbb{N}^*$ tel que P_n est vraie. Montrons P_{n+1} .

Il suffit alors montrer que $\frac{1+u_n}{2} > 0$

On pose $g: x \mapsto \frac{1+x}{2}$ qui est strictement croissante.

Alors: $0 < u_n \quad \downarrow$

$\Rightarrow 0 < g(u_n)$

$\Rightarrow 0 < \frac{u_{n+1}}{2}$

Donc: u_{n+1} est bien définie car on peut appliquer la racine carrée et v_{n+1} également car par stricte croissance de la fonction racine carrée, $u_{n+1} > 0$. Donc P_{n+1} est vérifiée.

Conclusion: par principe de récurrence, on a montré que $\forall n \in \mathbb{N}^*$ (en incluant le cas $n=1$ bien défini par définition), u_n et v_n existent et sont bien définis.

Donc (u_n) et (v_n) sont bien définies.

2) def suite - $v(n)$:

$$u = 0$$

$$v = 2$$

for k in range $(2, n+1)$:

$$u = np.sqrt((1+u)/2)$$

$$v = v/u$$

Return (v) .

3)a) On cherche (α_n) tel que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \cos(\alpha_n)$, avec (α_n) à valeurs dans $[0; \frac{\pi}{2}]$.

Déjà comme $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $0 \leq u_n \leq 1$, on sait que (α_n) doit être à valeurs dans $[0; \frac{\pi}{2}]$.

~~Si on pose $\alpha_n = \frac{\pi}{2^n}$ $\forall n \in \mathbb{N}$, on obtient qu'on a~~

On suppose qu'il en existe une, montrons l'unicité.

Supposons (α_n) et (β_n) tel que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \cos(\alpha_n) = \cos(\beta_n)$.

on: α_n et β_n sont à valeurs dans $[0; \frac{\pi}{2}]$.

on: $\cos(x)$ est injective sur cet intervalle.

Donc, on a par application de cette injection réciproque

$\forall n \in \mathbb{N}$, $\alpha_n = \beta_n$ the belle suite est donc unique.

3)b) $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \cos(\alpha_n)$ donc $u_{n+1} = \cos(\alpha_{n+1})$.

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{1+u_n}}{\sqrt{2}} = \cos(\alpha_{n+1})$$

$$\Rightarrow \frac{1+u_n}{2} = \cos^2(\alpha_{n+1}) \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \text{ car } u_n = \cos(\alpha_n)$$

$$\Rightarrow \cos(\alpha_n) = 2\cos^2(\alpha_{n+1}) - 1$$

on: $2\cos^2(x_{n+1}) - 1 = \cos(2x_{n+1})$.

Donc: $\cos(x_n) = \cos(2x_{n+1})$.

on: $x \mapsto \cos(x)$ effectue une bijection de $[0; \frac{\pi}{2}]$ dans $[0; 1]$.

Donc: par application de la bijection réciproque,

$\forall n \in \mathbb{N}^*$, $x_n = 2x_{n+1}$

$\Rightarrow \forall n \in \mathbb{N}^*$, $x_{n+1} = \frac{1}{2}x_n$

$\Rightarrow \forall n \in \mathbb{N}^*$, $x_n = \frac{1}{2^{n-1}}x_1$

$\downarrow$ on reconnaît une suite géométrique de raison $\frac{1}{2}$.

Donc: on: $\arccos(0) = \frac{\pi}{2} = x_1 = \arccos(x_1)$

Donc $x_1 = \frac{\pi}{2}$.

Donc:

$\forall n \in \mathbb{N}^*, x_n = \frac{\pi}{2^n}$

3)c) Alors, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $v_{n+1} = \frac{v_n}{x_{n+1}} = \frac{v_n}{\cos(\frac{\pi}{2^{n+1}})}$

Donc: comme $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $v_n > 0$, on a:

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{1}{\cos(\frac{\pi}{2^{n+1}})}$$

Soit $k \in \mathbb{N}^*$.

$$\prod_{n=1}^{k-1} \frac{v_{n+1}}{v_n} = \prod_{n=1}^{k-1} \frac{1}{\cos(\frac{\pi}{2^{n+1}})}$$

$\downarrow$ par télescopage

$$\Rightarrow v_k = 2 \prod_{n=1}^{k-1} \frac{1}{\cos(\frac{\pi}{2^{n+1}})}$$

on: la suite $(\frac{1}{2^n} v_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. Donc, on peut appliquer le développement.

Alors: $v_n \underset{n \rightarrow \infty}{=} 2^n \times \frac{\pi}{2^n} + o(\frac{\pi}{2^n}) = \pi + o(1)$ car $\frac{\pi}{2^n} = o(\pi) = o(1)$.

Donc:

$\lim_{n \rightarrow \infty} v_n = \pi$

Copie anonyme - n°anonymat : 467717

Emplacement
QR Code

Code épreuve : 297

Nombre de pages : 27

Session : 2026

Épreuve de : Mathématiques approfondies

Consignes

- Remplir soigneusement l'en-tête de chaque feuille avant de commencer à composer
- Rédiger avec un stylo non effaçable bleu ou noir
- Ne rien écrire dans les marges (gauche et droite)
- Numéroté chaque page (cadre en bas à droite)
- Placer les feuilles A3 ouvertes, dans le même sens et dans l'ordre

4) On sait que $\forall n \in \mathbb{N}, \forall n = 2^n \sin\left(\frac{\pi}{2^n}\right)$. on : $\frac{\pi}{2^n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

$$\begin{aligned} \text{Donc: } V_n &= 2^n \left(\frac{\pi}{2^n} - \left(\frac{\pi}{2^n}\right)^3 \times \frac{1}{6} + \left(\frac{\pi}{2^n}\right)^5 \times \frac{1}{120} + o\left(\left(\frac{\pi}{2^n}\right)^5\right) \right) \\ &= 2^n \left(\frac{\pi}{2^n} - \frac{\pi^3}{6} \times \frac{1}{2^{3n}} + \frac{\pi^5}{120} \times \frac{1}{2^{5n}} + o\left(\frac{1}{2^{5n}}\right) \right) \\ &= \pi - \frac{\pi^3}{6} \times \frac{1}{4^n} + \frac{\pi^5}{120} \times \frac{1}{4^{2n}} + o\left(\frac{1}{4^n}\right) \end{aligned}$$

Donc, en posant $a = \pi$, $b = -\frac{\pi^3}{6}$ et $c = \frac{\pi^5}{120}$, on a :

$$V_n = a + \frac{b}{4^n} + \frac{c}{4^{2n}} + o\left(\frac{1}{4^n}\right)$$

5) a) def suite - $w(n)$:

Retenir $((4^k \text{ suite } - v(n+1) - \text{suite } - v(n)) / 3)$

$$\begin{aligned} 5) b) 4V_{n+1} - V_n &= 4\pi - \frac{4\pi^3}{6 \times 4^{n+1}} + \frac{4\pi^5}{120 \times 4^{2n+2}} - \pi + \frac{\pi^3}{6 \times 4^n} - \frac{\pi^5}{120 \times 4^{2n}} + o\left(\frac{1}{4^n}\right) \\ &= 3\pi - \frac{3\pi^3}{120 \times 4^{2n+1}} + o\left(\frac{1}{4^{2n+1}}\right) \end{aligned}$$

$$\text{Donc: } w_n = \pi - \frac{\pi^3}{120 \times 4^{2n+2}} + o\left(\frac{1}{4^{n+1}}\right)$$

$$\text{Donc: } \lim_{n \rightarrow \infty} w_n = \pi$$

5) c) D'après la question précédente,

$$w_n = \pi - \frac{\pi^5}{120 \times 4^{2n+2}} + o\left(\frac{1}{4^{2n+1}}\right)$$

$$= \pi - \frac{\pi^5}{480 \times 4^{2n}} + o\left(\frac{1}{4^{2n+1}}\right)$$

or: on peut multiplier le petit o par un réel comme 4 sans que cela ne change sa nature - finalement,

$$w_n = \pi - \frac{\pi^5}{480 \times 4^n} + o\left(\frac{1}{4^n}\right)$$

De plus: $w_n - \pi = -\frac{\pi^5}{480 \times 4^n} + o\left(\frac{1}{4^n}\right)$

et $v_n - \pi = \frac{\pi^3}{6 \times 4^n} + \frac{\pi^5}{120 \times 4^{2n}} + o\left(\frac{1}{4^{2n}}\right)$

Donc: $\frac{w_n - \pi}{v_n - \pi} = \frac{-\frac{\pi^5}{480 \times 4^n} + o\left(\frac{1}{4^n}\right)}{\frac{\pi^3}{6 \times 4^n} - \frac{\pi^5}{120 \times 4^{2n}} + o\left(\frac{1}{4^{2n}}\right)}$

$$= \left(\frac{-\pi^5}{480 \times 4^n} + o\left(\frac{1}{4^n}\right) \right) / \left(\frac{20 \times 4^n \pi^3 - \pi^5}{120 \times 4^{2n}} + o\left(\frac{1}{4^{2n}}\right) \right)$$

$$= \left(\frac{-\pi^5}{480 \times 4^n} + o\left(\frac{1}{4^n}\right) \right) \left(\frac{4^{2n} \times 120}{20 \times 4^n \pi^3 - \pi^5} + o(4^{2n}) \right)$$

$$= \left(\frac{-\pi^5}{4} + o(1) \right) \left(\frac{1}{20 \times 4^n \pi^3 - \pi^5} + o(4^{2n}) \right)$$

$$= \frac{-\pi^5}{20 \times 4^n \pi^3 - \pi^5} + o(4^{2n})$$

5) d) la suite (u_n) se rapproche plus rapidement de la valeur π que la suite (v_n) .

Ainsi, il est plus avantageux d'utiliser (u_n) car elle a une plus grande rapidité de convergence.

6) a) $x_{n+1} = a + bq^{n+1} + cr^{n+1} + o(r^{n+1})$.

Alors on cherche α et β tel que

$$\alpha x_{n+1} + \beta x_n = a + dr^n + o(r^n)$$

i.e tel que $\alpha(a + bq^{n+1} + cr^{n+1}) + \beta(a + bq^n + cr^n) + o(r^n)$
 $= a + dr^n + o(r^n)$

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha + \beta = 1 \\ \alpha q + \beta = 0 \\ \alpha cr + \beta c = d \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \beta = 1 - \alpha \\ \alpha q + 1 - \alpha = 0 \\ \alpha cr + (1 - \alpha)c = d \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \beta = 1 - \alpha \\ \alpha = \frac{1}{1-q} \\ \frac{1}{1-q} cr + \left(1 - \frac{1}{1-q}\right) c = d \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \beta = \frac{-q}{1-q} \\ \alpha = \frac{1}{1-q} \\ d = \frac{c}{1-q} (R - q) \end{cases}$$

Donc: on définit (y_n) tel que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, y_n = \frac{1}{1-q} x_{n+1} - \frac{q y_{n-1}}{1-q}$$

6) b) $R \in]0; 1[$ et $R < q$.

Donc: $\left| \frac{R}{q} \right| < 1$

Donc: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{R}{q} \right)^n = 0$.

Donc $R^n = o(q^n)$.

Donc:

$$x_n = a + bq^n + o(q^n)$$

6)c) comme $R < q$, R converge plus rapidement vers 0 que q .

Donc: y_n convergera plus rapidement vers a que u_n .

exercice 3.

partie 1:

1) a) Soit $k \in \mathbb{N}^*$.

$$X_k(\omega) = [0; k].$$

et $\forall n \in [0; k], P(X_k = n) = \frac{1}{k+1}$ car les placements sont équiprobables.

Donc: $\forall k \in \mathbb{N}^*, X_k \in \mathcal{U}([0; k])$

1) b) Comme $X_k \in \mathcal{U}([0; k])$, alors X_k admet une espérance et une variance.

Alors:

$$\forall k \in \mathbb{N}^* \quad E(X_k) = \frac{k}{2} \quad \text{et} \quad V(X_k) = \frac{k(k+1)}{12}$$

2) a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

$[Y=n] = \left[\bigcap_{i=1}^{n-1} X_i > 0 \cap X_n = 0 \right]$ car $(Y=n)$ signifie que la première rebrousse à l'origine est au rang n i.e. $\forall i \in [1; n-1], X_i \neq 0$ et donc $X_i > 0$.

Donc: $\forall n \in \mathbb{N}^*, [Y=n] = \left[\bigcap_{i=1}^{n-1} X_i > 0 \cap X_n = 0 \right]$

$$\begin{aligned} 2) b) P(Y=n) &= P\left(\bigcap_{i=1}^{n-1} X_i > 0 \cap (X_n=0)\right) \quad \downarrow \text{car indépendance des } X_i \\ &= \prod_{i=1}^{n-1} P(X_i > 0) \times P(X_n=0) \\ &= \prod_{i=1}^{n-1} \frac{i}{i+1} \times \frac{1}{n+1} \quad \downarrow \text{par télescopage} \\ &= \frac{1}{n} \times \frac{1}{n+1} \end{aligned}$$

Copie anonyme - n°anonymat : 467717

Emplacement QR Code	Code épreuve : 297	Nombre de pages : 77	Session : 2026
	Épreuve de : Mathématiques approfondies		
	Consignes <ul style="list-style-type: none"> Remplir soigneusement l'en-tête de chaque feuille avant de commencer à composer Rédiger avec un stylo non effaçable bleu ou noir Ne rien écrire dans les marges (gauche et droite) Numéroter chaque page (cadre en bas à droite) Placer les feuilles A3 ouvertes, dans le même sens et dans l'ordre 		

or, on remarque que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\frac{1}{n} \times \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$

Donc, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $P(Y=n) = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$

2) c) Soit $k \in \mathbb{N}^*$.

$$\sum_{n=1}^k P(Y=n) = \sum_{n=1}^k \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = 1 - \frac{1}{k+1}$$

telescopage

$\lim_{k \rightarrow +\infty} 1 - \frac{1}{k+1} = 0$

Donc: $\sum_{n=1}^{+\infty} P(Y=n)$ converge et $\sum_{n=1}^{+\infty} P(Y=n) = 1$.

Donc: $P(Y=0) = 1 - \sum_{n=1}^{+\infty} P(Y=n) = 0$.

Donc: $P(Y=0) = 0$

2) d) Y admet une espérance $\Leftrightarrow \sum_{k=1}^{+\infty} k P(Y=k)$ converge (absolument)

or: $k P(Y=k) = k \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \frac{k}{k+1}$

$= \frac{1}{1 + \frac{1}{k}}$

$= \frac{1}{1 + \frac{1}{k+1}}$

On reconnaît alors le terme général d'une série de Riemann divergente. Par comparaison de séries à termes positifs,

Donc: γ n'admet pas d'espérance.

Partie 2.

3) def var $Z(n)$:

U = rd. rondint $(0; n)$

Z = rd. géométric (U)

Retour (Z).

4) a) $(U_n = k)_{k \in \{0; n-1\}}$ forme un système complet d'événements.
 Donc par la formule des probabilités totales,

$\forall i \in \mathbb{N}^*$,

$$\begin{aligned} P(Z_n = i) &= \sum_{k=0}^{n-1} P(U_n = k) P(Z_n = i | U_n = k) \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} P(U_n = k) P_{(U_n = k)}(Z_n = i) \quad \left. \begin{array}{l} \text{car la loi de } Z_n \\ \text{conditionnée à } (U_n = k) \end{array} \right\} \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n} \left(1 - \frac{k}{n}\right) \left(\frac{k}{n}\right)^{i-1} \quad \left. \begin{array}{l} \text{est géométrique de} \\ \text{paramètre } 1 - \frac{k}{n} \end{array} \right\} \\ &= \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{k}{n}\right)^{i-1} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{k}{n}\right)^i \end{aligned}$$

Donc:

$$\forall i \in \mathbb{N}^*, \quad P(Z_n = i) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{k}{n}\right)^{i-1} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{k}{n}\right)^i$$

4) b) $\forall i \in \mathbb{N}^*$, $f: x \mapsto x^{i-1}$ et $g: x \mapsto x^i$ sont des fonctions continues sur $[0; 1]$. Alors, on reconnaît la somme de deux sommes de Riemann.

$$\text{Dès lors,} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{k}{n}\right)^{i-1} = \int_0^1 f(t) dt = \int_0^1 t^{i-1} dt$$

Donc: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{k}{n}\right)^{i-1} = \left[\frac{t^{i-1}}{i} \right]_0^1$

$$= \frac{1}{i}.$$

De plus, par la même méthode,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{k}{n}\right)^i = \int_0^1 t^n dt$$

$$= \frac{1}{n+1}.$$

Donc: par somme de séries convergentes, $\forall i \in \mathbb{N}^*$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(Z_n = i) = \frac{1}{i} - \frac{1}{i+1}$$

4) c) On remarque alors que $\forall i \in \mathbb{N}^*$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} P(Z_n = i) = P(Y = i)$.

Donc: $Z_n \xrightarrow{\mathcal{L}} Y$ par caractérisation de la convergence en loi pour des probabilités discrètes.

5) On sait que toute loi géométrique admet une espérance.

Donc: $\forall k \in \{0; n-1\}$, $E(Z_n | M_n = k)$ existe.

De plus $\{0; n-1\}$ est un ensemble d'éléments finis donc la somme converge.

Par la formule de l'espérance totale,

$$E(Z_n) = \sum_{k=0}^{n-1} P(M_n = k) E(Z_n | M_n = k)$$

$$= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n} \times \frac{n}{n-k}$$

$$= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n-k} \quad \left. \begin{array}{l} \text{par changement d'indice.} \end{array} \right\}$$

$$= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

Donc: $E(Z_n) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$

6) a) Soit $k \in \mathbb{N}^*$.

$\forall t \in [k; k+1]$,

$$\frac{1}{k+1} \leq \frac{1}{t} \leq \frac{1}{k}.$$

Par croissance de l'intégrale,

$$\int_k^{k+1} \frac{1}{t+1} dt \leq \int_k^{k+1} \frac{1}{t} dt \leq \int_k^{k+1} \frac{1}{t-1} dt$$

$$\Rightarrow \frac{1}{k+1} \leq (\ln(t))_k^{k+1} \leq \frac{1}{k}.$$

$$\Rightarrow \frac{1}{k+1} \leq \ln(k+1) - \ln(k) \leq \frac{1}{k}.$$

Donc: $\forall k \in \mathbb{N}^*, \frac{1}{k+1} \leq \ln(k+1) - \ln(k) \leq \frac{1}{k}$

6) b) On prend le côté gauche de l'inégalité.

Alors, $\forall k \in \mathbb{N}^*, \frac{1}{k+1} \leq \ln(k+1) - \ln(k)$.

Soit $n \geq 2$.

Alors: $\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k+1} \leq \sum_{k=1}^{n-1} \ln(k+1) - \ln(k)$ par télescope

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k+1} \leq \ln(n)$$

$$\Rightarrow \sum_{k=2}^n \frac{1}{k} \leq \ln(n)$$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \leq \ln(n) + 1.$$

De l'autre côté, on a:

$$\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k} \geq \ln(n)$$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k} \geq \ln(n) + \frac{1}{n}.$$

Finalement, $\forall n \in \mathbb{N}^*, n \geq 2, \ln(n) + \frac{1}{n} \leq H(n) \leq \ln(n) + 1.$

Copie anonyme - n°anonymat : 467717

Emplacement QR Code	Code épreuve : 297	Nombre de pages : 27	Session : 2026
	Épreuve de : Mathématiques approfondies		
Consignes <ul style="list-style-type: none"> • Remplir soigneusement l'en-tête de chaque feuille avant de commencer à composer • Rédiger avec un stylo non effaçable bleu ou noir • Ne rien écrire dans les marges (gauche et droite) • Numéroté chaque page (cadre en bas à droite) • Placer les feuilles A3 ouvertes, dans le même sens et dans l'ordre 			

6) c) Comme $n \geq 2$, on peut diviser l'inégalité précédente par $\ln(n) > 0$

Donc, on a :
$$1 + \frac{1}{n \ln(n)} \leq \frac{E(n)}{\ln(n)} \leq 1 + \frac{1}{n \ln(n)}$$

on :
$$\lim_{n \rightarrow +\infty} 1 + \frac{1}{n \ln(n)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} 1 + \frac{1}{\ln(n)} = 1.$$

Donc, par encadrement,
$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{E(n)}{\ln(n)} = 1.$$

Donc :
$$\boxed{E(n) \sim \ln(n)}.$$

Problème .

Partie 1.

1) a) Soit $X \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{R})$ un vecteur propre associé à la valeur propre λ , avec $X \neq 0_{\mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{R})}$.

Donc : $AX = \lambda X \Rightarrow {}^tXAX = \lambda \underbrace{{}^tXX}_{\text{non nul car } X \neq 0_{\mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{R})}}$

Donc : $\lambda = \frac{{}^tXAX}{{}^tXX}.$

Donc :
$$\boxed{\exists X \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{R}) \setminus \{0_{\mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{R})}\}, \lambda = \frac{{}^tXAX}{{}^tXX}}$$

1) b) On a supposé que A était positive.

Donc: $\forall X \in \mathcal{M}_{n \times 1}(\mathbb{R}), \quad {}^t X A X \geq 0$.

De plus, $\forall X \in \mathcal{M}_{n \times 1}(\mathbb{R}) \setminus \{0 \in \mathcal{M}_{n \times 1}(\mathbb{R})\}, \quad {}^t X X = \|X\|^2 > 0$.

Donc, son produit, $\lambda = \frac{{}^t X A X}{{}^t X X} \geq 0$.

Donc: $\lambda \geq 0$.

2) a) A est une matrice symétrique donc diagonalisable. Il existe même une base d'orthogonalisation de A telle que cette base est orthonormée et formée de vecteurs propres de A .

On ramène $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n$ ces valeurs propres et B cette base.

On suppose alors que A est la matrice représentative d'un endomorphisme symétrique de $\mathbb{R}^n$ dans la base canonique orthonormée de $\mathbb{R}^n$.

Donc la matrice de passage de la base canonique de $\mathbb{R}^n$ à B est nécessairement orthogonale.

Ainsi, $\exists P \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ et D une matrice diagonale avec des vecteurs propres de A sur la diagonale tel que $A = P D {}^t P$.

2) b) Soit $X \in \mathcal{M}_{n \times 1}(\mathbb{R})$ et $Y = {}^t P X$.

Alors:

$$\begin{aligned} {}^t Y D Y &= {}^t ({}^t P X) D {}^t P X \\ &= {}^t X P D {}^t P X \\ &= {}^t X A X. \end{aligned}$$

Donc: ${}^t Y D Y = {}^t X A X$ avec $Y = {}^t P X$.

2) c) D est une matrice de $S_n^+(\mathbb{R})$.

Renc. $\forall Y \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{R}), {}^tYDY \geq 0$ $\rightarrow$ q. 2. b)
i.e. $\forall X \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{R}), {}^tXAX \geq 0$.

Renc. $\forall X \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{R}), {}^tXAX \geq 0$.

3) Pour la question 1 on a montré que si $A \in S_n^+(\mathbb{R})$, alors ses valeurs propres sont positives. De plus, dans la question 2, on a montré que si les valeurs propres de A sont positives alors $A \in S_n^+(\mathbb{R})$.

Alors: $A \in S_n^+(\mathbb{R}) \Leftrightarrow \text{Sp}(A) \subset \mathbb{R}_+$.

Partie 2.

4) a) $A \in S_n^+(\mathbb{R})$. Or d'après la partie 1, cela signifie que ses valeurs propres sont positives.

Alors, comme $x \mapsto \sqrt{x}$ est bien définie sur $\mathbb{R}_+$, et comme $(\lambda_1; \dots; \lambda_n)$ sont les valeurs propres de A , on a bien que la matrice Δ est correctement définie dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

4) b) Par la question 2 de la partie 1, on a que $B \in S_n^+(\mathbb{R})$
car $\Delta \in S_n^+(\mathbb{R})$.

De plus, $B^2 = (P\Delta P)^2 = P\Delta^2 P = P\Delta^2 P = P\Delta^2 P = A$.
car P est orthogonale

Renc $B^2 = A$.

5) Soit $(i, j) \in \{1, p\}^2$ avec $p \in \{1, n\}$.

$$L_i(p_i) = \frac{p}{\prod_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^p \frac{p_i - p_k}{p_i - p_k}} = 1^{p-1} = 1.$$

$$L_i(p_j) = \frac{p}{\prod_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^p \frac{p_j - p_k}{p_i - p_k}} = \frac{p_j - p_j}{p_i - p_j} \times \frac{p}{\prod_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^p \frac{p_j - p_k}{p_i - p_k}} = 0$$

Donc:

$$\forall (i, j) \in \{1, p\}^2, \quad L_i(p, i) = 1 \text{ et } L_i(p, j) = 0$$

Soit $k \in \{1, p\}$

$$\begin{aligned} 6) a) \quad S(p_k) &= \sum_{i=1}^p \sqrt{p_i} L_i(p_k) \\ &= \sqrt{p_k} L_k(p_k) \\ &= \sqrt{p_k}. \end{aligned}$$

Donc: $\forall k \in \{1, p\}, S(p_k) = \sqrt{p_k}.$

Comme $\forall i \in \{1, n\}, \exists k \in \{1, p\}, \lambda_i = p_k$, on a:

$$\forall i \in \{1, n\}, S(\lambda_i) = \sqrt{\lambda_i}$$

6) b) On pose $P_k: "A^k = P D^k \text{ tp}" \quad \forall k \in \mathbb{N}.$

Initialisation: $k=0$.

$$A^0 = I_n.$$

$$P D^0 \text{ tp} = P^t P = I_n \text{ car } P \text{ est orthogonale.}$$

Donc P_0 est vérifiée.

Hérédité: Soit $k \in \mathbb{N}$ tel que P_k est vérifiée. Montrons P_{k+1} .

$$A^{k+1} = A(A^k)$$

$$= A(P D^k \text{ tp})$$

$$= P D^k \text{ tp } P D^{k+1} \text{ tp}$$

$$= P D^{k+1} \text{ tp}$$

Donc P_{k+1} est vérifiée.

Conclusion: par principe de récurrence, on a montré que

$$\forall k \in \mathbb{N}, A^k = P D^k \text{ tp}$$

6) c) S est un polynôme. Or, par la question précédente, on a montré que pour n'importe quel degré k , $A^k = P D^k \text{ tp}$.

Ainsi, à des coefficients réels près, on a prouvé que

Copie anonyme - n°anonymat : 467717

Emplacement QR Code	Code épreuve : 297	Nombre de pages : 27	Session : 2026
	Épreuve de : Mathématiques approfondies		
Consignes <ul style="list-style-type: none"> • Remplir soigneusement l'en-tête de chaque feuille avant de commencer à composer • Rédiger avec un stylo non effaçable bleu ou noir • Ne rien écrire dans les marges (gauche et droite) • Numéroté chaque page (cadre en bas à droite) • Placer les feuilles A3 ouvertes, dans le même sens et dans l'ordre 			

$S(A) = P S(D) P^{-1}$. Or les coefficients sortent de toutes façons.

Donc :

$$S(A) = P S(D) P^{-1} \quad \xrightarrow{q.6a)}$$

De plus, $S(D) = \begin{pmatrix} S(\lambda_1) & & \\ & \ddots & \\ & & S(\lambda_n) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & (0) \\ & \ddots & \\ (0) & & \sqrt{\lambda_n} \end{pmatrix} = \Delta$.

Donc : $PA^{-1}P = S(A)$.

↙ car $B = PA^{-1}P$.

Donc : $S(A) = B$

Parce 3.

7) a) $C^2 = A$.

Donc $AC = C^2C = CC^2 = CA$.

Donc : $AC = CA$, i.e. A et C commutent

7) b) Soit $k \in \mathbb{N}$.

$$A^k C = C^{2k+1} = C C^{2k} = C A^k.$$

Donc : A^k et C commutent $\forall k \in \mathbb{N}$

Comme B est un polynôme de A , alors, comme C commute avec $A^k \forall k \in \mathbb{N}$, $S(A)$ et C commutent.

Or $B = S(A)$.

Donc:

B et C commutent.

8) a) Comme $BC = CB$, alors par transposition dans le monde des endomorphismes,

$$boc = cob$$

8) b) Soit $x \in E_i$.

$$\begin{aligned} b(c(x)) &= c(b(x)) \quad \downarrow \text{par linéarité de } c \text{ et } x \in E_i \\ \text{car } boc = cob &= \sqrt{p_i} c(x) \end{aligned}$$

Donc: $c(x) \in \ker(b - \sqrt{p_i} \text{id}) = E_i$. Ceci étant vrai $\forall x \in E_i$,

Donc: E_i est stable par c .

Soit $i \in \{2, p\}$,

8) c) $\forall c_i$ est l'endomorphisme induit sur E_i . Or, comme E_i est stable par c , c_i est symétrique sur E_i .

Donc:

$$\forall x \in E_i, \forall y \in E_i, \langle c(x), y \rangle = \langle x, c(y) \rangle$$

Donc: $\forall (x, y) \in E_i, \langle c_i(x), y \rangle = \langle x, c_i(y) \rangle$.

Donc: $\forall i \in \{2, p\}, c_i$ est symétrique.

8) d) On remarque que E_i est un espace propre de b associé à la valeur propre $\sqrt{p_i}$. De plus, comme c_i est symétrique, on en déduit que, comme E_i est stable par c , il existe une base orthonormale de vecteurs propres de b et que ces vecteurs propres sont également des vecteurs propres de c (car

$\forall i \in \{1, p\}$, E_i est stable par c et $boc = cob$.

Donc, il existe une base orthogonale B_i de E_i formée de vecteurs propres à la fois de c et b .

8) et si on fait la concaténation des bases $B_i \forall i \in \{1, p\}$, on a que B (la nouvelle base) est une base de $\mathbb{R}^n$ dans laquelle les matrices de b et c sont diagonales.

On construit alors B par la concaténation des $B_i \forall i \in \{1, p\}$

8) g). On a dans que dans une même base B ,

$\text{Mat}_B(b)$ et $\text{Mat}_B(c)$ sont diagonales.

or: comme $C^2 = B^2 = A$, on a que

$$\text{Mat}_B^2(b) = \text{Mat}_B^2(c) = \text{Mat}_B(A).$$

on: le fait que $\text{Mat}_B^2(b) = \text{Mat}_B^2(c)$ revient à

$$\Rightarrow \text{Mat}_B(b) = \text{Mat}_B(c)$$

car ces matrices sont diagonales à coefficients positifs.

Donc: Les valeurs propres et les vecteurs propres de b et de c sont identiques (identification sur la diagonale).

Enfin, on a bien que $C = B$.

Parce 4.

9) d'après la question 1, on a que $\exists X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $\lambda = \frac{XAX}{XAX} > 0$
Donc, $\forall \lambda \in \text{Sp}(A)$, $\lambda > 0$ si A est définie positive.

De plus, si $\text{Sp}(A) \subset \mathbb{R}_+^*$ la diagonale de D de la qu'on 2 sera remplie de coefficients positifs strictement

Donc: D est définie positive.

Donc, d'après la q. 2, A est définie positive.

Donc A définie positive $\Leftrightarrow \text{Sp}(A) \subset \mathbb{R}_+^*$

$$\begin{aligned} 10) a) \quad N &= N - I_n \\ &= N - I_n \\ &= N. \end{aligned}$$

Donc N est symétrique.

10) b) On a que $\text{Sp}(N) \subset \mathbb{R}_+$.

on: $N = N + I_n$.

Donc $\forall \lambda \in \text{Sp}(N), \lambda + 1 \in \text{Sp}(N)$.

Donc: $\text{Sp}(N) \subset [1; +\infty[$

Donc $0 \notin \text{Sp}(N)$.

Donc N est inversible.

De plus, $\text{Sp}(N^{-1}) \subset]0; 1]$ car $\text{Sp}(N) \subset [1; +\infty[$ et on sait que N^{-1} est symétrique également ($(N^{-1})^T = (N^T)^{-1} = N^{-1}$)

Donc: $\text{Sp}(I_n - N^{-1}) \subset [0; 1] \subset \mathbb{R}_+$ et que $I_n = NN^{-1}$

Donc $\text{Sp}(I_n - N^{-1}) = \text{Sp}(\underbrace{N^{-1}}_{\geq 0}(\underbrace{N - I_n}_{\geq 0}))$

Donc $I_n - N^{-1}$ est positive.

≥ 0 .

11) a) On sait que $S_2 - S_1$ est positive et que S_1 est définie positive. Donc $\text{Sp}(S_1) \subset \mathbb{R}_+^*$.

Supposons que $0 \in \text{Sp}(S_2)$. Alors, $\exists \lambda > 0$, $\lambda \in \text{Sp}(S_1)$ tel que

Copie anonyme - n°anonymat : 467717

Emplacement
QR Code

Code épreuve : 297

Nombre de pages : 27

Session : 2026

Épreuve de : Mathématiques approfondies.

Consignes

- Remplir soigneusement l'en-tête de chaque feuille avant de commencer à composer
- Rédiger avec un stylo non effaçable bleu ou noir
- Ne rien écrire dans les marges (gauche et droite)
- Numéroté chaque page (cadre en bas à droite)
- Placer les feuilles A3 ouvertes, dans le même sens et dans l'ordre

$(0-\lambda) \in \text{Sp}(S_2 - S_1)$. Or ceci est absurde car $S_2 - S_1$ est
positive.

Donc $0 \notin \text{Sp}(S_2)$.

Donc: S_2 est définie positive.

$$1) b) \text{Sp}(S_1^{1/2}) = \{ \sqrt{\lambda} \mid \lambda \in \text{Sp}(S_1) \}.$$

or: $0 \notin \text{Sp}(S_1)$ et par stricte croissance de $x \mapsto \sqrt{x}$,
seul $\sqrt{0} = 0$.

Donc: $0 \notin \text{Sp}(S_1^{1/2})$.

Donc: $S_1^{1/2}$ est inversible.

$$S_1^{-1/2} (S_2 - S_1) S_1^{-1/2} = S_1^{-1/2} S_2 S_1^{-1/2} - I_n \text{ car } S_1 = (S_1^{1/2})^2$$

Donc: $S_1^{-1/2} (S_2 - S_1) S_1^{-1/2} = S_1^{-1/2} S_2 S_1^{-1/2} - I_n$

$$\begin{aligned} 1) c) {}^t L &= {}^t (S^{-1/2} S_2 S^{-1/2}) \\ &= S^{-1/2} S_2 S^{-1/2} \\ &= L. \end{aligned}$$

Donc L est symétrique

De plus, d'après la question 10, on a que pour $L \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$,
 $\boxed{L - I_n \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})}$ q. 10.a)

Soit $X \in \mathcal{S}_{n,1}(\mathbb{R})$.

$${}^tX(L - I_n)X = {}^tX(S^{-1/2}S_2S^{-1/2})X = {}^tXX$$

11)d) S_2 est inversible. On note S_2^{-1} son inverse (car S_2 définie positive).
 Alors,

$$S^{1/2}S_2^{-1}S^{1/2} \times L = S^{1/2}S_2^{-1}S^{1/2}S^{-1/2}S_2S^{-1/2} \\ = I_n.$$

Donc $\boxed{L \text{ est inversible}}$

Donc, d'après la question 10.b) comme L est inversible,

$\boxed{I_n - L^{-1} \text{ est positive}}$.

car $I_n = L^{-1}L$ donc $I_n - L^{-1} = L^{-1}(L - I_n)$

on: $\text{Sp}(L^{-1}) \subset \mathbb{R}_+$ et $\text{Sp}(L - I_n) \subset \mathbb{R}_+$.

Donc: par produit, $\text{Sp}(I_n - L^{-1}) \in \mathbb{R}_+$.

11) e) On remarque que $S^{1/2}(S^{-1} - S_2^{-1})S^{1/2} = I_n - L^{-1} q. 11. d)$

Pour $S^{1/2}(S_1^{-1} - S_2^{-1})S_1^{1/2}$ est positive.

car; comme $S_1^{1/2}$ est inversible et positive, on a que

$$\text{Sp}(S_1^{-1} - S_2^{-1}) \subset \mathbb{R}_+$$

$$\text{car: } \forall X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \quad {}^tX S^{1/2}(S_1^{-1} - S_2^{-1})S_1^{1/2} X \geq 0$$

Pour: $\forall X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \quad {}^tX (S_1^{-1} - S_2^{-1}) X \geq 0$

$$\Rightarrow \boxed{S_1^{-1} - S_2^{-1} \text{ est positive}}$$

FIN

